

# 全球虫害治理专家 抗凝血杀鼠剂

大隆<sup>®</sup>  
TALON<sup>®</sup>



## ● 产品特点 ●

本品为一种抗凝血杀鼠剂，少量毒饵及单次投饵便能杀死鼠类，而且不需做灭鼠前投饵。大隆每堆投饵量少于其它抗凝血杀鼠剂。鼠类取食毒饵数天后便会死亡，对大隆不产生拒食现象。一般不需要多次投饵，因而可减少处理次数，节省大量人力、物力。

## ● 推荐使用剂量 ●

作物(或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
室内	家鼠	54-200克/亩	穴施、点施
室外	田鼠	54-200克/亩	穴施、点施

## ● 使用方法 ●

1. 在室内墙洞、下水道、鼠洞内及老鼠经常进食、饮水、筑巢或出没处，约每隔5米，投放20-30克毒饵。如鼠患严重时可视情况补充毒饵，直到完全收效为止。或将50-100克毒饵置于有盖的盒子内，盒子有小洞可容老鼠进入，沿作物仓库内围，约每隔10米放置一个盒子。注意防止家禽接近。
2. 田间：当有鼠类踪迹时，沿田垄每隔约十步或在鼠洞及其取食活跃处，每点投放5-10克毒饵，一周后补放毒饵。投饵量视鼠类为害情况而定，一般两次投饵总量为每亩54-200克为宜。投放点应避免非目标动物及鸟类取食，避免放置在潮湿处。

## ● 使用技巧 ●

1. 一旦注意到有鼠类活动的痕迹，就应及时投饵，防止成本增加。
2. 通过建立永久性的饵料投放站点，可以有效减少鼠类卷土重来，也可避免饵料受潮和非目标生物取食。



## ● 注意事项 ●

1. 该药剂有毒，需严格管理。投放药剂后要防止家禽、牲畜进入，避免有益生物误食。
2. 应保管在小孩触摸不到的地方。
3. 处理毒饵时，避免接触皮肤、污染衣物和鞋等，应戴手套、口罩、穿防护鞋。
4. 处理药剂后，必须立即洗手及清洗暴露的皮肤。彻底清洗防护用具。
5. 施用时应当采取的安全防护措施；避免孕妇及哺乳期妇女接触。
6. 切勿将饵剂与食物、饲料放在一起。人或动物误食均会中毒，毒饵经重复水洗或煮沸均不能解除毒效。
7. 死鼠及剩余的药剂要焚烧或土埋。
8. 切勿将毒饵弃于池塘、沟渠、河溪和湖泊中，以免污染水源。
9. 本品应加锁保存，贮藏在干燥、通风处。

## ● 中毒症状 ●

腹痛、背痛、恶心、呕吐、鼻子、齿龈出血、皮下出血、关节周围出血、尿血、便血等。

## ● 中毒急救 ●

1. 用药时如果感觉不适，立即停止工作，采取急救措施，并携带产品标签送医就诊。
2. 皮肤接触或污染衣物：立即脱掉被污染的衣物，用大量清水彻底冲洗被污染的皮肤。立即拨打急救电话、中毒控制中心电话，或请医生诊治。
3. 误服：立即携带标签，迅速送往最近的医院就诊。请勿引吐，除非向急救热线或中毒控制中心或医生咨询后，医生要求引吐时再引吐。

**紧急医疗措施：**由医务人员给中毒者服用或注射解毒剂。尽快鉴定病人血型，情况严重者需要输血。

**解    毒    剂：**维生素K1 (Phytomenadione BP)

**剂    量：**成人——40毫克/日 分次给药；儿童——20毫克/日 分次给药。  
解毒剂必须由医务人员给中毒者口服或注射。

**紧急救助电话：** 400-650-5726

