

產品概況

施杰蟑螂藥餌 (Siege Gel Insecticide) 首先在 1992 年於美國註冊，隨後在中國、阿根廷、巴西、法國、象牙海岸、墨西哥、巴拉圭和菲律賓等國家獲得註冊。本產品由德國 BASF 藥廠所研發，並在美國製造。藥餌的有效成份為氟蟻脞 (Hydramethylnon)，在香港漁農自然護理署登記的劑型為 2% Hydramethylnon，登記號碼為 2P218(GE)。

產品特點

- ✓ 針對蟑螂生活習性，殺滅率高
 - 有效成份為氟蟻脞，特別適用於社會性昆蟲
 - 24 至 48 小時內發生作用，其慢性作用機制通過蟑螂攜帶入巢穴，共享食物及攝食同類糞便等習性達到更高的殺滅率
 - 具有連鎖作用，通過幼蟲取食成蟲屍體及糞便，同時消滅成蟲和幼蟲
 - 對各種蟑螂，尤其是德國小蠊（細甲由）效果極佳，可防治已對氨基甲酸酯、菊酯類殺蟲劑產生抗藥性的各種蟑螂

- ✓ 施藥後有效期長達 3 至 6 個月
 - 根據蟑螂的取食習性設計，適口性極佳
 - 配方中含有較多水分，在放置後的 24 小時內膠體會失去一些水分，並在表面形成一層薄膜，使內裡仍保持濕潤
 - 實驗證明，施杰在 3 至 6 個月後仍保持良好的適口性和引誘力
 - 能在 0°C 至 50°C 溫度範圍內穩定貯藏

- ✓ 適合各種場所，尤其是噴霧不能處理或有嚴格規定的高標準場所
 - 施杰蟑螂膠餌是與傳統的噴霧和藥餌完全不同的新概念
 - 可直接深入縫隙施放藥餌，不易被兒童或寵物接觸
 - 無特殊氣味，不污染環境
 - 特別適合用於高標準場所，如：酒店、醫院、寫字樓、工廠、餐廳食肆、超級市場、護理院、廚房、寵物店、飛機、火車、輪船、機房、電腦房等

注意事項

- 藥劑應施放於蟑螂巢穴周圍及經常出沒的地方，如洞口、縫隙、角落、及活動範圍等
- 將定量的藥劑分成多個如綠豆大小的小圓粒施放，特別在防治德國小蠊時，此方法更加有效
- 施藥時不要污染食物，避免於食水、食物或食具附近施放藥劑
- 不要將施杰蟑螂藥餌施放於近期噴灑過殺蟲劑的地方，也不要將殺蟲劑噴灑在已施放的藥餌表面，以免引起蟑螂拒食
- 不要將施杰蟑螂藥餌施放於會被沾濕的地方，以免影響藥餌的持久性

安全事項

- 妥善存放於兒童和寵物不能觸及、避免陽光直接照射的陰涼地方
- 吞服可能有害，避免長時間接觸皮膚和眼睛
- 用後請徹底清洗雙手

急救措施

- ◇ 如不慎接觸皮膚，用大量水與肥皂清洗。如有刺激發生，請盡早求醫。
- ◇ 如不慎接觸眼睛，用大量水沖洗。
- ◇ 如不慎吞服，喝 1-2 杯水並用手指觸壓咽喉後部催吐。請勿對失去知覺的人催吐或在其口裡放入物件。

藥物保質期: 3 年

供應商：樂時國際有限公司

香港干諾道西 188 號

香港商業中心 2411 室

電話：2871 9021

電郵：info@joytimehk.com